

Infeções bacterianas tratadas com cursos de terapêutica antibiótica não superiores a sete (7) dias:

Tipo de infeção	Duração recomendada	Graus de Recomendação e Níveis de Evidência
Vias Urinárias		
Pielonefrite	7 dias	Ila B ^{1,2}
Cistite não complicada	1-7 dias*	I A ^{1,3}
Cistite complicada	7 dias	Ila B ¹
Pulmão		
Pneumonia da comunidade	5-7 dias**	I A ^{4,5}
Pneumonia hospitalar	7 dias	I A ^{6,7}
Infeções intra-abdominais		
Com controlo adequado do foco	4-7 dias	I A ⁸
Sem intervenção cirúrgica	7 dias	Ila C ⁸
Bacteriemia primária		
Com controlo do foco	7 dias	I B ⁹
Resolução clínica após retirada de cateter venoso central (CVC)	0-3 dias	IIb C ⁹
Meningite		
Por <i>Neisseria meningitidis</i> ou <i>Haemophilus influenzae</i>	7 dias	I C ¹⁰
Outros focos		
Pele e tecidos moles não complicados	3-7 dias	Ila B ¹¹
Amigdalite bacteriana	1 administração	I A ^{12,13}
Sinusite do adulto não recidivante	7 dias	I A ¹⁴

* 3-7 dias em idade pediátrica ** 7 dias em idade pediátrica

Infeções bacterianas agudas que necessitam mais de sete (7) dias de terapêutica antibiótica

Tipo de infeção	Duração recomendada	Graus de Recomendação e Níveis de Evidência
Cistite ou pielonefrite complicada com resolução clínica lenta	10 dias	IIb B ²
Prostatite	4-6 semanas	Ila C ²
Pneumonia por <i>Legionella spp</i>	10-14 dias	I A ¹⁵
Pneumonia por bacilos de Gram negativo não fermentadores	7-14 dias	Ila B ⁶
Pneumonia a <i>Pneumocystis jiroveci</i>	21 dias	Ila B ¹⁵
Pneumonia necrotizante	10-14 dias	Ila C ¹⁵
Abcesso pulmonar	4-6 semanas	Ila C ¹⁵
Empiema	2-6 semanas	IIb C ¹⁵
Foco intra-abdominal persistente	10-14 dias	Ila B ⁸
Colite pseudomembranosa	10 dias	I A ¹⁶⁻¹⁸
Bacteriemia por <i>Staphylococcus aureus</i>	14-21 dias	I A ^{9,10}
Meningite por <i>Streptococcus pneumoniae</i>	10 dias	I C ¹⁰
Meningite por bacilos de Gram negativo, <i>Streptococcus agalactiae</i> ou <i>Listeria spp</i>	14-21 dias	I C ¹⁰
Abcesso cerebral	4-8 semanas	Ila B ^{10,20}
Osteomielite hematogénea	4-8 semanas	Ila B ²¹
Artrite séptica	2-4 semanas	II A ²²
Artrite séptica em prótese	2-3 meses	II A ^{22,23}
Fasceíte necrotizante/gangrena gasosa	Variável*	I C ¹¹
Pericardite bacteriana	4 semanas	Ila C ²⁴
Endocardite não complicada de válvula nativa**	4 semanas	I A ²⁴
Pós-operatório de endocardite	2 semanas	I A ^{24,25}
Mediastinite	10-14 dias	IIIb C ²⁶
Febre tifoide	14 dias	I A ²⁷
Brucelose	6 semanas	I A ²⁸
Doença de Lyme	14-28 dias	I C ²⁹

*Duração da terapêutica fundamentada no processo clínico do utente

**Quando causada por *Streptococcus* do grupo *viridans* ou *S. bovis* com elevada sensibilidade à penicilina e sensíveis à gentamicina, a duração indicada para o tratamento com a associação dos dois fármacos é de duas semanas (IIA)24.